

中国科技论文统计源期刊
临床医学类核心期刊
中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
中国期刊全文数据库全文收录期刊
俄罗斯《文摘杂志》来源期刊
美国《化学文摘》来源期刊
美国《剑桥科学文摘》来源期刊

ISSN 1008-1062

CN 21-1381/R

CODEN ZLYYA2



中国临床医学影像杂志

JOURNAL OF CHINA CLINIC MEDICAL IMAGING

第17卷 第8期 2006年8月

Vol. 17 No. 8 Aug. 2006

ISSN 1008-1062



9 771008 106032

中国医科大学
China Medical University

中国临床医学影像杂志

ZHONGGUO LINCHUANG YIXUE YINGXIANG ZAZHI

月刊 1990年5月创刊 第17卷 第8期 2006年8月20日

主 管

中华人民共和国卫生部

主 办

中国医学影像技术研究会
中国医科大学

承 办

辽宁省医学影像学会
中国医科大学第二临床学院

编辑出版

《中国临床医学影像杂志》编辑部
110004, 沈阳市和平区三好街36号
电话:(024)23925069
传真:(024)23925069
电子信箱:jccmisy@mail.syy.ln.cn
网址:<http://zgleyxyzz.periodicals.com.cn>

主 编

郭启勇

常务副主编

吴振华

编辑部主任

邓丽洁

广告经营许可证

沈工商广字 2101001500003

印 刷

中国人民解放军第七三一三工厂

发 行

国内:沈阳市邮局

国外:中国国际图书贸易总公司
(北京 399 信箱, 100044)
代号:1483MO

订 购

全国各地邮电局
邮发代号 8-25

邮 购

《中国临床医学影像杂志》编辑部
110004, 沈阳市和平区三好街36号
电话:(024)23925069

国 内 定 价

每期 6.00 元, 全年 72.00 元

中 国 标 准 刊 号

ISSN 1008-1062
CN 21-1381/R

目 次

论著

- MR 扩散张量成像在脑囊性坏死性肿瘤与脓肿鉴别诊断中的价值 史瑞华, 郑明臣, 翟仁友, 等(421)
成人内耳结构多层螺旋 CT 三维成像方法初探 王士兴, 吴金兴, 华 晓(425)
霉菌性鼻窦炎的 CT 诊断(附 18 例分析) 郑秋平, 李志中(428)
彩色多普勒超声对乳头溢液的病因诊断与鉴别 孙咏梅, 王正滨, 房世保, 等(431)
明胶海绵加丝线栓塞支气管动脉治疗大咯血 王宝明, 王洪新, 许 健, 等(435)
生长抑素受体显像剂 ^{99m}Tc -HYNIC-TOCA 和 ^{99m}Tc -P829 在肿瘤模型中的对比研究 孙 逊, 安 锐, 李 炫, 等(438)
超声导引下介入治疗继发孔型房间隔缺损及合并畸形 428 例临床报告 邓东安, 侯传华, 朱鲜阳, 等(444)
正常肝脏高机械指数造影成像触发间隔与效应关系的定量分析 吴凤林, 李颖嘉, 李传刚(447)
先天性肠闭锁的 X 线诊断价值 方必东, 白光辉, 许崇永, 等(450)
MSCT 多期扫描在早期肾癌诊断中的应用价值 古杰洪, 莫 蕾, 王海林(452)
宫腔声学造影与经阴道超声诊断子宫内膜息肉的 ROC 曲线分析 徐 勇, 蔡爱霞, 杨泽宇, 等(455)
脂质沉积性肌病的 MRI 诊断 郑贤应, 慕容慎行, 李银官, 等(458)
 ^{18}F -FDG PET 在探查临床“不明原因发热”中的应用 李培勇, 江旭峰, 张立颖, 等(461)

综述

- PET 在难治性癫痫中的应用价值与限度 潘 博, 马云川(464)

论著摘要

- MSCT 重建图像对鼻息肉向周围侵犯的诊断价值 范广军, 夏 奥, 尹建忠(468)

[期刊基本参数] CN21-1381/R * 1990 * m * A4 * 421 * zh * P * 6.00 * 5000 * 25 * 2006-08

本刊如有印装质量问题, 请将原杂志寄回编辑部, 由本刊负责调换。

脂质沉积性肌病的MRI诊断

郑贤应,慕容慎行,李银官,倪希和,曹代荣
(福建医科大学附属第一医院,福建 福州 350005)

[摘要] 目的:研究脂质沉积性肌病(LSM)的MRI表现,并评价MRI在LSM诊断中的应用价值。材料和方法:选择骨盆及双侧大腿肌肉,对9例LSM患者行MRI检查,采用自旋回波序列(SE)、快速自旋回波序列(FSE)及短时反转恢复序列(STIR)。结果:8例LSM患者的受累肌群均表现为片状短T₁长T₂异常信号,以臀肌及大腿后肌群受累为主,2例活动期患者的病变肌肉中尚混杂有斑片状长T₁长T₂异常信号影;1例无阳性表现。结论:LSM的MRI表现具有一定的特征性,受累肌群主要表现为脂肪沉积改变,在活动期,肌纤维可见斑片状坏死信号,病变双侧对称;MRI能为LSM的诊断、疗效判断及病情随访提供客观资料,并能为临床选取准确的活检部位提供定位。

[关键词] 肌疾病;磁共振成像

[中图分类号] R685;R445.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1008-1062(2006)08-0458-03

Diagnosis of MRI in lipid storage myopathy

ZHENG Xian-ying, MURONG Shen-xing, LI Yin-guan, NI Xi-he, CAO Dai-rong
(The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou 350005, China)

Abstract: Objective: To investigate MRI findings of lipid storage myopathy(LSM), and evaluate the clinical value of MRI for LSM. Materials and Methods: Nine cases with LSM proved by biopsy underwent MRI of pelvis and thigh, spin echo sequence, fast spin echo sequence and short tau inversion recovery(STIR) were used. Results: The signal intensity of diseased muscle in 8 cases with LSM was hyperintense on T₂WI and T₁WI, and hyperintense signal intensity on T₂WI and iso-intense on T₁WI was seen on 2 patients as well. One patient had no positive findings. Conclusion: The MRI findings in LSM show certain characteristics: the involved muscles show lipid storage findings symmetrically, and the necrotic-like signal can be seen in the active stage as well. MRI can provide objective data for clinical diagnosis, therapeutic evaluation and follow-up. It can also help to decide the accurate site for biopsy.

Key words: muscular diseases; magnetic resonance imaging

脂质沉积性肌病(LSM)是长链脂肪酸代谢障碍导致脂质沉积在肌纤维中引起的一组肌病,有关其MRI表现的报道国内尚未发现。本文旨在探讨LSM的MRI表现,并评价MRI在LSM诊断中的价值。

1 材料与方法

搜集我院1998年4月~2002年4月在我院神经内科就诊的9例LSM患者,男5例,女4例,年龄4~36岁,平均24.9岁。病程9月~12年,平均6.8年;一般为亚急性起病,1例为初次发病,5例为复发患者,临床均有不同程度的肌无力症状,另有3例患者已完全缓解达2~4年,临床无明显症状。肌酶检查肌酸磷酸激酶(CPK)217~3297IU/L,平均950IU/L(正常值25~200IU/L),乳酸脱氢酶(LDH)303~3080IU/L,平均1132IU/L(正常值109~245IU/L)。所

[收稿日期] 2006-01-09

[作者简介] 郑贤应(1969-),男,福建大田人,主治医师。

有患者均行肌电图(EMG)检查,结果提示肌源性肌病;所有患者均经肌肉病理活检证实。

扫描设备应用Toshiba Flexart 0.5T超导型磁共振机,利用正交体部线圈及正交头部线圈。全部受检者均行轴面平扫,未行增强扫描。扫描部位均选择骨盆及双侧大腿。

扫描序列为自旋回波序列(SE)T₁WI(TR600ms,TE30ms),快速自旋回波序列(FSE)T₂WI(TR3000ms,80ms),短反转时间反转恢复序列(STIR)T₂WI(TR2000ms,TE30ms,TI150ms);层厚10mm,间隔10mm;视野(FOV)35cm×35cm,矩阵198×256。

2 结果

LSM的MRI信号特点:受检9例患者中8例有

阳性发现,受累肌群于 T₂WI 及 T₁WI 均呈片状及斑片状高信号,信号较淡,STIR 序列中高信号受抑制呈低信号改变,病变弥漫,境界模糊,双侧基本对称(图 1~3),其中 2 例活动期患者于股后肌群及内收肌群尚混杂有长 T₁ 长 T₂ 信号(图 4),提示肌纤维的坏死改变。1 例缓解期患者(病程 2 年)的受检肌群

未见明显阳性表现。

受累的 8 例患者的臀肌、股后群肌及内收肌群均受累,其中,臀大肌及股二头肌信号均异常者 8 例,股四头肌信号异常者 5 例,所有患者的髂腰肌均不受累。在所有病变肌群中,以股中间肌受累最轻,臀大肌受累较重。




Figure 1. Transverse T₁WI in a 38-year-old woman with lipid storage myopathy of one year duration in pelvic region, the signal of bilateral gluteus shows hyperintense, which suggested the storage of fat. The signal of the bilateral iliopsoas is normal. **Figure 2, 3.** Transverse image in a 13-year-old boy with lipid storage myopathy of 3 year duration in pelvic region, the signal of the bilateral femoral muscles appears hyperintense both in T₂WI and T₁WI, which suggested the storage of fat in the involved muscles. **Figure 4.** Transverse STIR image in a 21-year-old man with lipid storage myopathy of 3 year duration with 2 months' acute outbreak in the leg, the signal of bilateral posterior femoral muscles and the adductors appears hyperintense, which suggested the necrosis of the involved muscles.

3 讨论

LSM 是指由于肌纤维内脂肪代谢障碍,致使肌细胞内脂肪堆积而引起的一类肌病。目前,生化方面比较明确的 LSM 有肉毒碱缺乏症、肉毒碱棕榈转移酶(CPT)缺乏症、乙酰辅酶 A 脱氢酶缺乏症,此外,线粒体内的其它酶,如细胞色素 C 氧化酶、肌腺苷脱氨酶缺乏症等也可引起继发性的肉毒碱或 CPT 缺乏和脂肪氧化障碍,造成脂肪堆积。

临幊上,LSM 主要表现为急性或亚急性起病,四肢近端肌无力,伴或不伴有肌痛,肌电图显示为肌源性损害,血清肌酶可明显升高,并有缓解-复发的病程,酷似多发性肌炎,二者易于混淆,临幊确诊主要依靠肌肉的病理活检。其病理表现主要为肌纤维空泡变性,脂滴沉积增多,部分病例的肌纤维可以发生局灶性坏死^[1-3]。

在 MRI 表现上,正常肌肉组织的信号为介于骨皮质与皮下脂肪之间的中等强度信号,于 T₂WI 上,各块肌肉间可见条带状高信号影,代表肌肉间隙的结缔组织,于 T₁WI 上,肌肉内尚可见弧线样高信号,代表正常的肌束衣上的少量脂肪。

LSM 受累肌群在 MRI 上主要表现为 2 种信号改变,即短 T₁ 长 T₂ 信号及等 T₁ 长 T₂ 信号,前者提示脂肪沉积改变,后者提示肌纤维的坏死改变,且以脂肪沉积改变为主要表现。坏死性病变见急性活动期的患者中,以大腿的股后肌群及内收肌明显,这种改变与临幊的病理活检结果存在差异,因为病理检查在大多数的病例中均未发现肌纤维的坏死性病変^[1-3],这可能是因为各受检者的病程不一以及取材部位不同有关。在下肢,病变以臀大肌、内收肌及股后肌群受累明显,病程长者肌肉可见萎缩,股四头肌受累较轻,髂腰肌不受累。

多发性肌炎(PM)在临幊上的表现与 LSM 相似,二者常易混淆,在 MRI 上,PM 也主要表现为 2 种信号改变,即长 T₁ 长 T₂ 的炎症水肿信号及短 T₁ 长 T₂ 的脂肪信号,虽然 2 种疾病的病理基础不同,但 MRI 无法区别是肌纤维的局灶性坏死或是炎症细胞的浸润。但 PM 的 MRI 表现是以炎症水肿信号为主要影像特征,脂肪病变只见于疾病的较晚期^[5],而且所占比例较少;而 LSM 则以脂肪堆积为主要影像特征,局灶性的肌纤维坏死见于急性活动期患者,其所占比例亦较少。在病变部位上,LSM 的脂肪信

号以臀大肌最明显，股后肌群及内收肌群次之，股四头肌最轻，少量的坏死信号主要见于股后肌群及内收肌群，其它部分少见；而PM的炎症水肿信号见于各肌群，呈弥漫性改变，肌膜亦可受累增厚^[1]。

LSM在临幊上有时也与进行性肌营养不良症(PMD)相混淆，PMD在下肢各肌群也大部分以脂肪替代为主要改变，但其程度更重，范围更明显，而且股薄肌、内收肌、半腱肌及缝匠肌相对保存完好。

MRI能够判断肌肉病变的部位及范围，能够区别肌肉的脂肪变性或炎症水肿病变，根据二者所占比例及病变分布特点，能为LSM的诊断提供帮助，尤其是临幊在鉴别LSM与PM存在困难时，具有特别重要的意义。另外，其对临幊进行肌肉活检及EMG检查选取适当的肌肉也具有较强的指导意义。

(上接451页)狭窄；后者发病晚，呕吐物不含胆汁，平片无双泡征，胃肠造影表现为幽门呈鸟嘴征、线样征、肩样征等。

腹部立位平片是诊断先天性肠闭锁简便、易行且有效的导向性检查方法，可排除液气腹，确定是低位还是高位梗阻。在肠梗阻基础上，灌肠检查可分为手术治疗提供更多的影像学依据，可排除其它消化道先天畸形如中肠旋转不良、先天性全结肠型巨结肠等，同时对患者术后结肠功能恢复起很大作用。灌肠若显示盲端，可直接诊断结肠闭锁；若为细小结肠，低位肠梗阻可提示远端小肠闭锁，高位肠梗阻可提示多发肠道畸形。碘水口服法只能发现小肠最近端的闭锁(第一梗阻点)，远端闭锁、下消化道梗阻及其它异常均不能良好显示，须靠手术时注

(上接454页)病理证实肾门淋巴结转移，已属Ⅲ期肾癌。有作者认为≤3cm的肾癌大多数有假包膜，其恶性程度低于无包膜的肾癌^[1]，但由于上述误诊病例可见，有无包膜不能作为判断肿瘤恶性程度的指征，即使小肾癌有包膜者也会出现早期转移。

与常规CT、单层螺旋CT相比，MSCT的优点是扫描速度快，呼吸运动所致伪影少，一次注射造影剂即可完成多期增强扫描，可发现富血管肾癌的典型血管高峰显影，强大的后处理功能，令诊断信息更丰富，大大减少了漏诊、误诊。在检出肾癌并显示其范围、评价肿瘤供血、肿瘤附近组织、肾静脉或下腔静脉及淋巴结受累情况方面，MSCT多期扫描具明显优越性，提高了早期病变的检出率，为肾癌分期、临床制定正确的手术方案提供重要参考。

【参考文献】

- [1]陈琳，郭玉璞，任海涛，等. 貌似多发性肌炎的脂质沉积性肌病病理改变[J]. 中华神经科杂志, 2001, 34: 81-83.
- [2]陈琳，郭重，郭玉璞，等. 脂质沉积性肌病的临床和病理特点[J]. 中华神经科杂志, 1998, 31: 165-167.
- [3]高绚熙，李丽，刘明. 脂质性肌病的临床及病理分析[J]. 临床神经病学杂志, 2000, 13: 361-362.
- [4]崔丽英，汤晓美，张秋滨，等. 肌电图在鉴别诊断脂质沉积性肌病和炎性肌病的价值[J]. 中华神经科杂志, 1997, 30: 269-271.
- [5]Fujino H, Kobayashi T, Goto I, et al. Magnetic resonance imaging of the muscles in patients with polymyositis and dermatomyositis[J]. Muscle & Nerve, 1991, 14: 716-720.
- [6]郭亮，谢道海，陈爱明. 皮肌炎的MRI诊断[J]. 中华放射学杂志, 2001, 35: 933-935.
- [7]郑贤应，倪希和，慕容慎行. MRI在进行性肌营养不良症中的应用研究[J]. 中华放射学杂志, 2001, 35: 761-765.

水及探查发现，低位闭锁盲端则显示不佳，另外该检查可能加重新生儿梗阻，导致吸人性肺炎等并发症，故笔者认为碘水口服法应慎用。

【参考文献】

- [1]Ozguner IF, Savas C, Ozguner M, et al. Intestinal atresia with segmental musculature and neural defect [J]. J Pediatr Surg, 2005, 40(8): 1232-1237.
- [2]顾志成，孙庆林，汪健，等. 先天性肠闭锁和狭窄102例报告[J]. 中华小儿外科杂志, 2004, 25(1): 92-93.
- [3]徐和平，李晓明，高雅君，等. 腹部平片对先天性肠闭锁诊断价值的研究[J]. 医学影像学杂志, 2004, 14(9): 781-782.
- [4]高明远. 小儿先天性巨结肠的X线诊断(附35例分析)[J]. 医学影像学杂志, 2003, 13(8): 609-610.
- [5]程普选，虞 岁，任刚. 小儿先天性肠旋转不良的X线影像探讨[J]. 中国临床医学影像杂志, 2004, 15(11): 616-618.

【参考文献】

- [1]吴阶平. 泌尿外科学[M]. 济南：山东科学技术出版社, 2004. 898-917.
- [2]郭燕，黄兆民，刘明娟，等. 螺旋CT在小肾癌诊断中的应用[J]. 中华放射学杂志, 2001, 35(8): 628-629.
- [3]Kopka L, Fischer U, Zoeller G, et al. Dual-phase helical CT of the kidney: value of the corticomedullary and nephrographic phase for evaluation of renal lesions and preoperative staging of renal cell carcinoma[J]. AJR, 1997, 169: 1573-1578.
- [4]Yamashita Y, Honda S, Nishiharu T, et al. Detection of pseudocapsule of renal cell carcinoma with MR imaging and CT [J]. AJR, 1996, 160: 1151-1155.
- [5]Sheth S, Scaritige JC, Horton KM, et al. Current concepts in the diagnosis and management of renal cell carcinoma: role of multidetector CT and three-dimensional CT[J]. Radiographics, 2001, 21(Special Issue): 237-254.
- [6]郑祥武，吴恩福，张建青. 无症状小肾癌的CT诊断(附6例报告)[J]. 中国临床医学影像杂志, 2000, 11(1): 32-34.